

Les tiques

Quels problèmes
et quelles
solutions ?

Webinaire 15 juin 2026



****Ixodes ricinus****
Tique du mouton

SOMMAIRE

1. Carte d'identité

- ❖ Définition
- ❖ Espèces
- ❖ Lieux de vie
- ❖ Conditions climatiques
- ❖ Cartographie: les zones favorables à la présence des tiques

2. Cycle de vie d'une tique

3. Anatomie et pique d'une tique

4. Les maladies transmises par les tiques

4.1 La borréliose de Lyme

4.2 Le virus de la fièvre hémorragique de

Crimée-Congo (FHCC)

4.3 L'encéphalite à tique

5. La prévention

6. Signalement et projets en cours

7. Outils à disposition





Ixodes ricinus
Tique du mouton


Les tiques

1. Carte d'identité

Définitions

tique: acarien hémaphrogame qui se nourrit exclusivement de sang. Il se fixe par la tête dans la peau des animaux et parfois de l'homme et peut transmettre des maladies.

acarien: arachnide, minuscule, voire microscopique, au corps globuleux portant une tête conique pourvue de chélicères et de pédipalpes, vivant souvent en ectoparasite de l'homme, des animaux ou des plantes.



Les espèces de tiques vectrices de maladies chez l'Homme

Tableau 1 – Caractéristiques des tiques vectrices de maladies infectieuses et parasitaires chez l'Homme présentes en Auvergne-Rhône-Alpes

Genre / espèce Présence en ARA	Taille et morphologie des tiques adultes	Risques sanitaires <u>principaux</u> et agents pathogènes en cause
<i>Ixodes</i> <i>I. ricinus</i> 	 Petite taille : 1 à 3 mm, brun foncé, pas de motif	• Borréliose de Lyme (bactéries du complexe <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>) • Encéphalite à tiques (virus de l'encéphalite à tiques ou TBEV) • Tularémie (<i>Francisella tularensis</i>) • Anaplasmose granulocytaire humaine (<i>Anaplasma phagocytophilum</i>) • Babésiose (<i>Babesia divergens</i>, <i>B. microti</i>)
<i>Dermacentor</i> <i>D. reticulatus</i> , <i>D. marginatus</i> 	 Taille moyenne : 3 à 4 mm, écusson blanc chez la femelle, aspect marbré chez le mâle	• SENLAT / TIBOLA / DEBONEL* (<i>Rickettsia slovaca</i>, <i>R. raoulti</i>) • Tularémie (<i>Francisella tularensis</i>)
<i>Hyalomma</i> <i>H. marginatum</i> 	 Grande taille : 5 à 6 mm, brun, pattes rayées bicolores	• Fièvre hémorragique de Crimée-Congo (virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo)

900 espèces dans le monde
Une quarantaine d'espèces en France mais seules quelques unes piquent l'homme.

Ixodes ricinus est la plus répandue: partout en France et en dessous de 1 800 m d'altitude. *Ixodes ricinus* peut transmettre plusieurs agents pathogènes dangereux pour le bétail et les animaux domestiques – causant par exemple la piroplasmose et l'anaplasmose bovine –, mais aussi la borréliose de Lyme chez l'être humain

Répartition géographique des tiques en France



Ixodes




Dermacentor



Rhipicephalus



Hyalomma ●




Milieux de vie: Ixodes, Dermacentor

Les zones boisées et humides (les buissons, les herbes hautes, les lisières des forêts, les clairières et les zones à végétation dense) où elles peuvent facilement se fixer sur un animal de passage pour se nourrir.



Cartographie: les zones favorables à *Ixodes ricinus*



- **Zones les plus favorables** à la présence de tiques:
 - le centre,
 - le nord-est,
 - le sud-ouest.
- **Habitats les moins favorables:**
 - les régions méditerranéennes
 - les régions de haute montagne.

Milieux de vie: Hyalomma

Les zones **sèches et chaudes** (garrigue, herbes sèches...)



Départements où la présence de *Hyalomma marginatum* a été documentée en France *

** Selon les études et données du Cirad et de l'Anses, actualisées en 2024*



Conditions climatiques

Les tiques sont fortement influencées par les **conditions climatiques, l'altitude et la végétation**. Elles sont très **sensibles à la sécheresse** et se trouvent généralement dans les zones abritées où la végétation est abondante.

Les tiques résistent bien aux périodes froides ou chaudes, pendant lesquelles elles se mettent en **diapause**, c'est-à-dire avec un métabolisme ralenti au maximum.




-20°C: mort
+ 8°C pendant
plusieurs jours: réveil
Période hivernale:
diapause
9°C - 22°C: activité
maximale



Source: inrae

Pics d'activités



Source: <https://www.chru-strasbourg.fr/>

Conditions climatiques

Les tiques n'aiment pas l'hiver, mais ...

Dans des conditions hivernales, les tiques ne se sont pas au meilleur de leur forme. Ces arachnides préfèrent la chaleur et l'humidité. Pendant la saison froide, elles dénichent les endroits les plus chauds et les plus humides pour y passer l'hiver. Les tiques sont donc attirées par les endroits où elles sont couvertes par des feuilles ou des aiguilles et protégées des intempéries et de leurs prédateurs.

Les tiques sont les plus actives au printemps et en automne

En termes de climat, les tiques préfèrent une **chaleur modérée avec de l'humidité**. Il n'est donc pas étonnant que ces suceurs de sang soient particulièrement actifs lorsque le temps est agréable, au printemps et en automne. De mars à novembre, le risque de se faire piquer par une tique est bien plus élevé que pendant les mois plus froids.





Les tiques

2. Cycle de vie



FREDON
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

Cycle de vie




Figure 2. Cycle biologique de la tique *Ixodes ricinus*.

Source: Tiques et santé – J. Durand


C'est durant le **second repas sanguin**, qui permet le passage de la nymphe au stade adulte, que la bactérie déjà présente dans le système digestif de la nymphe **passera la barrière intestinale**. **Elle rejoindra les glandes salivaires et sera transmise à l'hôte sur lequel la tique se trouve en train de se gorgé de sang.** **Les nymphes** représentent un **risque élevé** de transmission de la bactérie si elles sont infectées car, en raison de leur petite taille, elles passent inaperçues sur le corps et peuvent être confondues avec des grains de beauté.

L'**infection** se produit dans **les premières 24 h** suivant la morsure de la tique adulte, parfois même plus vite pour les nymphes. L'occasion de rappeler la nécessité d'enlever les tiques le plus tôt possible après la piqûre afin de prévenir l'infection.

Source: www.pasteur.fr



Les stades de développement



Au cours de sa vie, qui dure en moyenne de 2 à 3 ans, **4 stades** de développement sont décrits :

l'œuf, la larve (taille < 1mm), la nymphe (entre 1 et 2 mm), et l'adulte (>2 mm).

Entre chaque phase de développement et pour qu'elle puisse pondre ensuite, la tique a besoin d'un repas sanguin unique. Dans ce but, la tique reste accrochée à son hôte, parfois pendant plusieurs jours. Une fois le repas terminé, elle se détache, tombe au sol et mue vers le stade suivant.

Adulte : multiplie sa masse par 100 lors de son repas.



3. Anatomie et morsure



FREDON
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

FACE DORSALE

hypostome

FACE VENTRALE

palpes


base de capitulum

bouclier oval non orné


pore génital

sillon anal

anus




La pièce buccale



Chélicères + hypostome = **rostre**.


La pièce buccale centrale, semblable à une longue épée, est appelée **hypostome**. Les bords et la face inférieure de celui-ci sont couverts de rangées de piquants courbés vers l'arrière. L'hypostome comporte également un **sillon** en son centre, qui achemine la salive de la tique dans son hôte, et le sang de l'hôte dans la tique. L'hypostome est surmonté d'une paire de **chélicères**, de longues tiges qui se terminent par une dent crochue.

A table!



- Après avoir choisi l'endroit où elle veut piquer, tout en émettant une **salive anesthésiante** (elle est gentille : on ne sent rien !) elle commence à découper la peau avec **ses chélicères** et à enfoncer progressivement **son hypostome** pour atteindre un petit vaisseau.
- Son repas peut durer entre 3 à 10 jours.

Répartition des piqûres de tiques par milieux



Répartition des morsures de tiques par milieux. @Citique

- Il est à noter que les massifs forestiers sont les principaux lieux de piqûres déclarées.
- Les jardins privés arrivent en second avec presque 30%.



Source: inrae



4. Des vecteurs de maladies



FREDON
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

Dans le **monde**, les tiques sont le **1er vecteur de maladies chez l'animal** et le 2e pour l'homme (derrière les moustiques).

En **Europe**, **1er vecteur de maladies chez l'homme** avant les moustiques.

Les maladies à tiques sont en majorité des **zoonoses** : les agents infectieux qui les causent sont transmis à l'être humain à partir des animaux.



Ixodes

Ixodes ricinus

Borreliose de Lyme,
Virus Encéphalite à tique



Hyalomma

Hyalomma

Virus de la fièvre hémorragique
de Crimée-Congo (FHCC)



Dermacentor

Dermacentor

Virus de l'encéphalite à tique

Comment la tique devient-elle vectrice d'agents pathogènes?

Dès le stade de larve, au moment de son premier repas, la tique peut être infectée par un parasite, une bactérie ou un virus pathogène présent chez l'hôte sur lequel elle a pris son repas. Elle peut alors être infectée toute sa vie si les agents pathogènes ingérés sont capables d'être transmis au travers des mues successives.


Elle deviendra elle-même vectrice si l'agent pathogène survit et traverse la paroi de son tube digestif, puis migre vers ses glandes salivaires pour être transmis lors de son repas de sang suivant, via ses sécrétions salivaires.

En réalité, environ la moitié des tiques portent un ou plusieurs agents pathogènes, ce qui complique d'autant le diagnostic en cas de transmission.

Source: www.inrae.fr



Source: [inrae](http://inrae.fr)





La
borreliose
de Lyme

Présentation générale



Source: <https://www.paysan-breton.fr>



Seules les tiques du **genre *Ixodes*** peuvent transmettre la bactérie *Borrelia burgdorferi* à l'humain au moment d'une piqûre.

Les larves d'*Ixodes ricinus* ne transmettent pas cette bactérie. La borréliose de Lyme n'est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats, etc.) ni d'une personne à une autre.

On estime qu'une tique sur 5 est porteuse de la bactérie *Borrelia* en France.

● Présence de la bactérie *Borrelia*

✗ Pas d'infection par *Borrelia* possible




Source : citique.fr

Taux d'incidence

Il y a environ **50 000 nouveaux cas** diagnostiqués par an en France. Cette donnée reste une estimation car la maladie de Lyme n'est pas une maladie à déclaration obligatoire.

Evolution du taux d'incidence de l'indicateur Maladie de Lyme




Source : sentiweb.fr

Taux d'incidence en AuRA

En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'incidence moyen calculé sur la période 2019-2024 est parmi le plus élevé en France hexagonale : 98 cas/100 000 habitants.

Moyenne nationale : 53 cas /100 000 habitants

Une vigilance toute particulière est donc nécessaire, tant de la part des usagers que des professionnels de santé.



Des disparités très importantes existent entre les départements

Les départements les plus touchés de la région sont : la **Haute-Savoie**, l'**Ain** et le **Puy-de-Dôme**.

Symptômes

La maladie évolue selon trois phases : primaire, secondaire et tertiaire.


La phase primaire est caractérisée par une plaque rouge indolore autour de la piqûre, s'étendant rapidement, et d'une taille supérieure ou égale à 5 cm au point d'inoculation. C'est ce que l'on appelle l'érythème migrant. Il s'agit de la manifestation la plus fréquente (environ 80% des cas). Si la maladie n'est pas traitée à ce stade précoce, des complications neurologiques, articulaires, cardiaques ou cutanées peuvent survenir lors des phases secondaire et tertiaire de la maladie.

La phase secondaire débute quelques semaines après l'éruption cutanée. Son expression clinique varie cependant fortement d'un patient à l'autre. Elle peut se manifester par des érythèmes migrants multiples, des manifestations neurologiques ou plus rarement articulaires, cutanées, cardiaques ou ophtalmologiques.

La phase tertiaire est une phase disséminée tardive et correspond à une évolution chronique de la maladie. A ce stade, on observe principalement des manifestations articulaires, cutanées ou nerveuses.

Même si la maladie n'est pas mortelle, en l'absence de traitement, elle peut laisser des séquelles handicapantes.

Source: www.pasteur.fr



Source: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsociallyme.com%2Fmaladie-de-lyme-symptomes>



Traitement

Recommandations de la HAS en 2022:

- **Pas de traitement systématique** après une morsure de tique.
- Si un érythème migrant apparaît : **traitement par antibiotiques** pendant 14 jours (doxycycline, amoxicilline ou azithromycine), sans nécessité d'examen complémentaire. Traitement efficace si pris précocement.
- Le traitement antibiotique recommandé ne doit pas dépasser 28 jours - sauf dans le cadre d'un protocole de recherche défini par un centre spécialisé désigné par le ministère chargé de la santé.



L'encéphalite à tique

- TBEV: Tick Borne Encephalitis Virus ou
- méningo-encéphalite (FSME)



Source : https://ednieuw.home.xs4all.nl/Spiders/Ixodidae/Ixodes_ricinus_D9152.jpg



Source : <https://pixnio.com/free-images/fauna-animals/insects-and-bugs/male-ixodes-ricinus-tick-shown-copulating-with-a-female-tick.jpg>

Symptômes et traitement

Maladie à déclaration obligatoire depuis 2021.

❑ Incubation

2 à 28 jours après la piqure de tique

❑ Symptômes: 2 phases espacées de 2 à 8 jours

- 1^{ère} phase: **pseudo-grippale** associée à des signes non spécifiques (fièvre, céphalées, arthromyalgies) ;
- 2^{ème} phase: observée dans environ 30% des cas, une **atteinte du système nerveux central** (encéphalite, méningite, myélite) ou périphérique (parésie ou paralysie d'un membre) qui peut laisser des séquelles neurologiques pendant plusieurs années.


❑ Traitement

Pas de médicament antiviral spécifique. Traitement symptomatique uniquement
Vaccin : Ticovac Encepur...



Source: <https://www.platforme-esa.fr>

Transmission



- **Transmission**
piqûre de tique infectée
ou par consommation
de lait cru ou fromage
au lait cru (chèvre et
brebis principalement)

- **Réservoirs**
Les petits rongeurs,
comme les souris et
les campagnols, sont
les principaux hôtes
réservoirs du TBEV.

Aire de répartition en Europe



La France représente la limite de distribution la plus à l'ouest du TBEV en Europe.

En France, 167 cas ont été notifiés entre mai 2021 et mai 2023:

- 30 en 2021
- 36 en 2022
- 39 en 2023
- 62 cas en 2024

Départements de contamination TBE

AuRA est l'une des régions les plus touchées par les cas d'encéphalite à tique.

Figure 4. Distribution de 77 cas de TBE signalés en France en 2025, et rapportant un unique département d'exposition




Tableau 2 - Répartition des cas de TBE par département de contamination, en 2024 et en cumulé depuis le début de la surveillance en 2021, Auvergne-Rhône-Alpes (N=67)

Département de contamination	Nombre de cas en 2024	Nombre total de cas depuis 2021
Ain	1	3
Allier	1	1
Ardèche	0	2
Cantal	0	0
Drôme	0	0
Isère	4	7
Loire	5	8
Haute-Loire	1	2
Puy-de-Dôme	0	4
Rhône	0	5
Savoie	2	4
Haute-Savoie	13	31
Auvergne-Rhône-Alpes	27	67

Date de publication : 12 mai 2026

ÉDITION NATIONALE

Cas d'infection par le virus de l'encéphalite à tique (TBE) signalés en France en 2025

Points clés

- En 2025, l'augmentation du nombre de cas signalés s'est poursuivie avec une **augmentation de 53 % par rapport à 2024** (qui avait déjà vu un quasi doublement des cas). Le signalement obligatoire de la TBE étant en vigueur depuis 2021, les tendances épidémiologiques de ces infections doivent être interprétées avec prudence
- **L'augmentation observée pourrait s'expliquer par deux facteurs principaux** : une augmentation réelle de l'incidence, et une montée en puissance de la surveillance, incluant une meilleure connaissance de la maladie associée à une recherche plus systématique du diagnostic et une appropriation du signalement.

Source : santepubliquefrance.fr



La fièvre
hémorragique de
Crimée-Congo
(FHCC)

Hyalomma marginatum



Tique *Hyalomma marginatum* adulte sur une pièce de 1 euro



Critères de reconnaissance:

- pattes rayées
- 8 mm à l'âge adulte: elle est plus grosse que les autres espèces que l'on retrouve en France

Habitats favorables



Garrigue et maquis typiques du pourtour méditerranéen où la tique *Hyalomma marginatum* peut être installée

Présentation générale

La FHCC est endémique dans certains pays (Afrique, Asie, Moyen-Orient) et également présente dans certains pays d'Europe de l'Est et du Sud, et notamment en Espagne.

En France, si le virus de la FHCC a été détecté pour la première fois sur des tiques collectées dans des élevages bovins du sud du pays en 2023, aucun cas humain autochtone n'a été constaté à ce jour.

La FHCC est une infection causée par un virus qui peut provoquer chez l'humain de la fièvre, des frissons, des troubles digestifs et, dans de rares cas, une maladie hémorragique avec des saignements incontrôlés.

Symptômes et traitement

- **Incubation**


1 à 3 jours après la piqûre de tique / 5 à 6 jours après contact avec tissus ou sang infectés

- **Symptômes**

La grande majorité des infections à FHCC sont asymptomatiques (80% des cas).

Apparition brutale de symptômes : fièvre + myalgies

Si la maladie hémorragique se développe, on observe l'apparition d'éruptions pétéchiales muqueuses ou cutanées, avec généralement des saignements. Le taux de létalité est de 10 à 40%.



- **Traitement**


Il n'existe à ce jour pas de vaccin contre la FHCC.


Traitement antiviral : Ribavirine : mais pas de consensus car études cliniques discordantes

Legend

- Present
- Introduced
- Antic. Absent
- Obs. Absent
- No data
- Unknown

Countries/Regions not viewable in the main map extent*


-  Malta
-  Monaco
-  San Marino
-  Gibraltar
-  Liechtenstein
-  Azores (PT)
-  Canary Islands (ES)
-  Madeira (PT)
-  Jan Mayen (NO)



Endémique en **Espagne et Afrique du Nord**, installée en **Corse** depuis de nombreuses années, elle est également présente depuis une dizaine d'années sur l'ensemble du **littoral méditerranéen français** (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes).

Présence de *Hyalomma marginatum* en France hexagonale

La tique géante à pattes rayées (*Hyalomma*) progresse en Europe



Source: ECDC, EFSA

« Nos collectes ont montré que la tique se répartissait sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, dans des **habitats naturels ouverts plutôt secs tels que la garrigue ou le maquis**. D'après les modèles climatiques futurs, le climat méditerranéen risque de s'étendre, en particulier dans la vallée du Rhône, et sur la côte atlantique à l'ouest, il est probable que **l'aire de répartition de cette espèce s'étende** », estime Laurence Vial, vétérinaire acarologue au Cirad, et spécialiste des tiques.

Présence de *Hyalomma marginatum* en France hexagonale



Transmission


Maladie à déclaration obligatoire.

- **Transmission**

Par piqûre de tique infectée ou **par contact avec le sang d'un animal ou d'une personne infectée**.

Il existe un risque de transmission associé aux **soins**. Les activités de **chasse, d'élevage** ou **d'abattage** sont à risque également.

Les animaux piqués par la tique au stade adulte sont les ruminants, les équidés, les cervidés et les sangliers (avec une période d'activité de la tique adulte de mars à fin juillet). Aux stades préliminaires, elles se nourrissent sur les rongeurs, les lièvres, lapins et les oiseaux (avec une période d'activité pour les tiques à ces stades de juillet à octobre).





5. La prévention des piquûres de tiques



Prévention: avant et pendant une sortie à l'extérieur

- porter des **vêtements longs** qui couvrent les bras et les jambes, un chapeau, rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes, et la chemise dans le pantalon.
- **vêtements clairs** : repérer plus facilement les tiques.
- emmener un **tire-tique**
- utiliser des **répulsifs** (certaines HE: eucalyptus citronné, géranium rosat, citronnelle de Java, tea tree, clou de girofle, lavande aspic)
- **éviter les broussailles, les fougères et les herbes hautes**

PRÉVENTION DES PIQÛRES DE TIQUES

ET MALADIE DE LYME



Les piqûres de tiques peuvent provoquer des maladies sérieuses, telle que la maladie de Lyme

AVANT - PENDANT - APRÈS UNE ACTIVITÉ DANS LA NATURE

1



Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements longs.

2



Je pense à prendre un tire-tique avec moi.

3



Je peux utiliser un répulsif en respectant le mode d'emploi.

4



Je reste sur les chemins.

5



J'inspecte soigneusement mon corps après une activité dans la nature.

En cas de piqûre, je retire la tique à l'aide d'un tire-tique et j'en parle sans tarder à mon médecin.




Prévention: après une sortie à l'extérieur

Il est déconseillé d'utiliser des produits (éther, liquide vaisselle, etc.) qui risquent de provoquer une régurgitation de la tique et donc un risque accru de contamination.




Surveiller la zone de piqûre pendant 4 semaines. En cas d'apparition d'un érythème migrant (plaque rouge et ronde, voir photographie en p.5) ou de signes généraux (fièvre, malaise, courbatures) : consulter son médecin.





CiTIQUE



TIQUOJARDIN

6. Signalements et projets en cours

❖ Sciences participatives : Citique

- CiTIQUE est un programme de recherche participative où les citoyens peuvent aider les chercheurs à mieux connaître l'écologie des tiques et des agents pathogènes qu'elles transmettent par piqûre
- Application « signalement tique » (à télécharger sur le téléphone) pour déclarer la tique et la piqûre



GRÂCE À L'APPLICATION SIGNALEMENT TIQUE

1

VOUS PARTICIPEZ À UNE COLLECTE MASSIVE DE DONNÉES
ET AIDEZ LES CHERCHEURS À MIEUX CONNAÎTRE LES TIQUES
ET LES MALADIES QU'ELLES TRANSMETTENT

2

VOUS BÉNÉFICIEZ D'UN SUIVI POST PIQÛRE



DES NOTIFICATIONS VOUS INDIQUERONT
LES PROCÉDURES À SUIVRE

ET POUR ENVOYER LA TIQUE

IL SUFFIT DE SCOTCHER LA TIQUE
SUR UN PAPIER ABSORBANT

(MOUCHOIR EN PAPIER OU ESSUIE-TOUIT)



EN INDIQUANT :
VOTRE NOM
VOTRE E-MAIL
ET LA DATE DE VOTRE S



EN AGISSANT AINSI VOUS CONTRIBUEZ À CONSTITUER
UNE TIQUOTHÈQUE



ET VOUS AIDEZ LA RECHERCHE

TOUT EN BÉNÉFICIANT D'INFORMATIONS UTILES



FREDON
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

L'opération TIQUoJARDIN a besoin de vous (et de votre jardin)

1 juin 2022

Plus d'un quart des piqûres de tiques ont lieu dans les jardins des particuliers, selon les données de CiTIQUE. Cependant, on connaît mal les facteurs qui influencent la présence des tiques dans ces lieux, ni si cela représente un **risque pour la santé humaine**, les tiques pouvant transmettre des agents pathogènes, comme ceux responsables de la maladie de Lyme.

Bilan campagnes 2021 et 2022
<https://youtu.be/xkOLKrKERUc>

• Phase 2 (2023 - 2025) - EN COURS, PARTICIPEZ !

Vers une meilleure caractérisation du risque dans certains jardins de Nancy et ses environs

[Cliquez ici pour en savoir plus](#)

L'OBJECTIF SCIENTIFIQUE DE TIQUoJARDIN

Mieux connaître **le risque sanitaire lié aux tiques dans les jardins** en y étudiant

- ① | **LA DENSITÉ DE TIQUES PRÉSENTES**
- ② | **LA FRÉQUENCE DE PIQÛRES DE TIQUES**
- ③ | **LES AGENTS PATHOGÈNES PRÉSENTS DANS CES TIQUES**

Enquête participative réalisée entre 2023 et 2025

Vers une meilleure caractérisation du risque lié aux tiques dans certains jardins. Quelles questions de recherche ?

Les tiques sont-elles présentes toute l'année dans les jardins ?

Quels animaux favorisent la présence de tiques dans les jardins ? *

* Les tiques réalisent des repas de sang sur certains animaux (p. ex. souris, hérissons, renards) . À la fin de ce repas, les tiques se détachent et tombent au sol. Le passage de ces animaux dans les jardins pourrait donc favoriser la présence de tiques.

Image par Freepik



Les caractéris'tiques

QUELLE EST CETTE BESTIOLE ?




UN CRIS RICRIEN :

- 8 pattes
- Divisé en deux parties : la tête et une grosse partie postérieure

La tique n'appartient pas à la famille des insectes, comme le fourmi, qui n'ont que 6 pattes et un corps divisé en trois parties.


COMMENT SE DÉVELOPPE-T-ELLE ?



COMMENT PIQUE-T-ELLE ?

La tique ouvre la peau avec deux petits crochets et introduit son rostre. Celui-ci est muni de petites dents qui fixent solidement la tique. La piqûre de tique est sans douleur. La tique prend ensuite son unique repas de sang qui peut durer entre 3 et 5 jours.

« Soyez prudent : la tique peut être porteuse de nombreux microbes à l'origine de maladies chez l'homme et l'animal. »



7. Outils à disposition

L'info TIQUES

Avant propos

L'UNION RÉGIONALE
DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATIVES
POUR L'ENVIRONNEMENT (URCPIE)
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

a réalisé cette exposition en
partenariat avec l'Agence
Régionale de Santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes afin de
contribuer à la prévention des
piqûres de tiques et des maladies
vectorielles qu'elles peuvent
transmettre.

Cette exposition
pédagogique en
6 panneaux vise à :

- vous expliquer
ce qu'est une tique
et ses lieux de vie,
- vous informer
sur les gestes préventifs,
- vous recommander
d'être attentif
aux piqûres de tiques.



Remerciements à l'Institut National de Recherche Agronomique et toutes
les structures qui ont permis de réaliser l'exposition.

Concepteurs, textes : Comité Technique Régional - Union Régionale des Centres
Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en page et illustrations : Vincent Gaudin

Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Auvergne-Rhône-Alpes

L'info TIQUES

Les caractéristiques

QUELLE EST
CETTE BESTIOLE ?




UN CRIS ACRIEN :

- 3 pattes
- Divisé en deux parties :
- la tête et une grosse
partie postérieure

La tique n'appartient pas à la famille des
insectes, comme le fourmi, qui n'est
que 6 pattes et un corps divisé en trois parties.

COMMENT SE
DÉVELOPPE-T-ELLE ?



COMMENT
PIQUE-T-ELLE ?

La tique ouvre la peau avec deux petites
écailles et introduit son rostre.
C'est-ci est muni de petites dents qui
fixent solidement la tique.
La piqûre de tique est sans douleur. La
tique prend ensuite son unique repas de
sang qui peut durer entre 3 et 5 jours.

« Soyez prudent : la tique peut être
porteuse de nombreux microbes
à l'origine de maladies
chez l'homme et l'animal. »



Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Auvergne-Rhône-Alpes

1

L'info TIQUES

Les lieux problématiques

LES MILIEUX
HUMIDES LUI SONT
FAVORABLES

Grandes herbes et broussailles en
bordure de forêt, chemins forestiers
embroussaillés, sols humides,
mares humides...



UN ACARIEN
GRIMPEUR ET COUREUR

- La tique, en général, ne tombe pas des arbres.
- La tique se déplace sur le sol avant de se
suspendre sur un végétal.
- La tique attend le passage d'un animal
pour s'accrocher à son futur hôte.
- La tique rejoint une zone chaude et
humide de la peau pour s'implanter.

LES SAISONS
À TIQUES

La tique peut piquer
du printemps
(début avril)
à l'automne
(début novembre)
dans tous les milieux où
l'humidité est présente.

ÊTES-VOUS
EXPOSÉ ?

- Oui, si vous êtes
attirés par les
plantes :
- Ramasser
- Courir à pied
- Ramasser des
champignons
- Chasser
- Pêcher



Mais aussi, si
vous travaillez
en forêt ou :

- Marcher
- Agent forestier
- Propagateur
- Agriculteur
- Jardinier

L'augmentation des populations
de tiques est favorisée par :

- La raréfaction des prédateurs
naturels des tiques.
- La modification des paysages
moins favorables aux prédateurs
des petits rongeurs.
- Le changement climatique.



Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Auvergne-Rhône-Alpes


2

L'info TIQUES

Les tactiques de prévention

Choisissez des
chemins ou des
sentiers bien
entretenus.

Évitez les hautes
herbes et les
broussailles.



Une tonte régulière dans
les parcs et les jardins est
un moyen de se
protéger des tiques.

QUELS HABITS PORTER ?

Dans la mesure du possible :

- Habillez-vous avec des vêtements
couvrant le corps entier.
- Prenez des chaussures fermées.
- Chaussez éventuellement des gants.
- Mettez des vêtements clairs qui laissent
voir plus facilement les tiques.

Prenez votre
tête-tique
avec vous.



Vaporisez vêtements et
chaussures de produits
anti-tiques avec toutes
les précautions d'usage.

Faites attention aux
contres indications
pour les enfants et
les femmes enceintes.

N'oubliez pas d'utiliser aussi un
produit anti-tique pour les animaux
qui vous accompagnent.
En balade eux aussi peuvent
attraper de nombreuses tiques.



Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement Auvergne-Rhône-Alpes

3

L'info TIQUES



Un désagrément également urbanis'tique

DES TIQUES EN VILLE, EST-CE POSSIBLE ?

Oui ! C'est ce qui a montré le projet européen « EDENext » réalisé entre 2011 et 2014 dans 22 pays.

De même, les premiers résultats de l'étude « Etasq » menée dans les parcs urbains de l'agglomération de Lyon en 2019 par l'INRAE et VetAgro Sup confirment la présence de tiques dans certains espaces verts des villes.



Les chercheurs utilisent un drap pour collecter les tiques (500 passages sur 5 mois pour l'étude "Etasq").

D'OÙ VIENNENT-ELLES ?

Dans les parcs, jardins, aires de loisirs et coulées vertes, il est possible d'être au contact de tiques, en particulier dans les espaces moins entretenus (gestion écologique) comme les herbes hautes, prairies et sous-bois.

Les espaces verts constituent des couloirs écologiques (essentiels pour la biodiversité) ou circulent des animaux potentiellement porteurs de tiques (renards, chevreuils, oiseaux, ...) venus des zones péri-urbaines. Au cœur des villes, les tiques sont ensuite transportées par les rongeurs, éboulis, oiseaux, hérissons, lièvres et animaux domestiques.

RESTEZ VIGILANTS MÊME EN VILLE :

Evitez de vous étendre dans les herbes hautes.
Préférez les espaces dégagés plutôt que les sous-bois, forêts et les haies pour vos activités sportives et de détente.
Promenez-vous sur les zones tondues et les allées.
Préférez les aires de jeux gravillonnées, revêtues ou avec une végétation rase et sèche (pâtis).



Pique-niquez sur une table ou une couverture, pas directement dans l'herbe.

et n'oubliez pas les autres tactiques de prévention !



L'info TIQUES



Les gestes pra'tiques au retour




Pourquoi enlever la tique rapidement ? Plus elle reste longtemps dans la peau, plus le risque de transmission de maladies augmente.

BIEN S'INSPECTER

Les piqûres de tique ne font pas mal et ne grattent pas, elles peuvent passer inaperçues.

Il faut donc inspecter minutieusement son corps avec une attention particulière pour les zones à peau fine et peu visibles, les endroits chauds et humides : plis cutanés, aisselles, aines, parties génitales, ... et en particulier chez le jeune enfant : le cuir chevelu, le cou et l'arrière des oreilles.

Il est souvent nécessaire de se faire aider par un proche ou d'utiliser un miroir si vous êtes seul.



ET APRÈS L'INSPECTION

Prendre une douche ou un bain dans les 2 heures qui suivent votre sortie permet de se débarrasser des tiques qui ne sont pas encore agrippées.

Ne pas remettre les vêtements portés dehors après la douche, une tique peut s'y cacher ! Les laver rapidement. Attention, elles peuvent aussi s'accrocher à vos chaussures.



Certains d'entre eux attendent car la tique, le plus souvent des stades de nymphes, ne mesure que 2 à 3 mm et ressemble à un bouchon soudeux. Il peut être utile de faire une recherche inspectant en le le redressant car la tique, en partie gonflée de sang, sera plus visible.

N'oubliez pas d'inspecter aussi vos animaux de compagnie, ils sont des porteurs privilégiés des tiques et peuvent vous les transmettre.



L'info TIQUES



Les gestes destruc'tiques



Pour enlever la tique, utilisez un tire-tique, c'est l'outil le plus adapté ! Il permet de retirer par rotation sans comprimer le corps du parasite. Cet outil est disponible en pharmacie et en animalerie.



LES 4 ÉTAPES NÉCESSAIRES

1 - Glissez le crochet sous la tique sans l'écraser, au plus près de la peau, insérez la tique dans la fente du tire-tique.

2 - Tournez doucement comme avec un tournevis (2 ou 3 tours) jusqu'à ce que la tique se détache.

3 - Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique.

4 - Sans la toucher à mains nues, mettez la tique dans un mouchoir ou sur un adhésif placé au congélateur 10 mn pour la tuer. Ensuite, jetez-la à la poubelle, ou mieux, envoyez-la à l'OSQ.



Attention ! Un tire-tique est mal utilisé s'il est utilisé sans attache, ou s'il est utilisé sans attache, ou s'il est utilisé sans attache.

GESTES À NE PAS FAIRE

Ne mettez aucun produit sur la tique, (vaseline, éthanol, alcool, anesthésiques locaux, ...).

Ne comprimez surtout pas le corps de la tique avec les ongles ou autre outil.



Car vous risquez :
- de lui faire régurgiter dans votre peau les microbes qu'elle contient.
- de laisser sa tête dans la peau pouvant provoquer une inflammation nécessitant de consulter un médecin ou un pharmacien.



RECHERCHE CITIQUE

Des chercheurs de l'INRAE, associés à plusieurs partenaires, ont lancé en 2017 le projet de recherche participative CITIQUE. Celui-ci mobilise des citoyens volontaires pour mieux connaître les tiques et les agents infectieux qu'elles transportent.

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, c'est très simple !

1. SIGNEZ vos piqûres de tiques ou celles d'animaux.
2. PHOTOGRAPHIEZ les tiques retirées.
3. ENVOYEZ vos tiques à l'OSQ.

Plus d'infos sur <http://www.citique.fr>



Vous pouvez aussi télécharger l'application SIGNEZ TIGUE.

L'info TIQUES



En cas de piqûre, quel diagnos'tique ?

- Toutes les tiques ne sont pas porteuses de maladies.

- Certaines maladies dont la maladie de Lyme peuvent être transmises par la tique à l'homme ou à l'animal au moment d'une piqûre.

- La maladie de Lyme n'est pas contagieuse, elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de la tique (oiseaux, chiens, chats) ni d'une personne à une autre.



Selon la zone géographique, de 5% à plus de 20% des tiques sont infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

EN CAS DE PIQÛRE, SURVEILLEZ LA ZONE PIQÛÉE PENDANT UN MOIS.

Dans les jours ou semaines ou mois plus tard

Une plaque rouge, appelée « érythème migrant », peut apparaître autour de la zone de piqûre et s'étendre progressivement.

A ce stade, une consultation de votre médecin traitant s'impose.

L'érythème migrant est caractéristique de la maladie de Lyme. Si son diagnostic est confirmé, aucun examen complémentaire n'est utile à ce stade, un traitement antibiotique de 2 à 3 semaines vous sera prescrit.


Quelques semaines ou mois plus tard

En l'absence de traitement, peuvent survenir :
- des atteintes du système nerveux (nerfs, paralysie faciale, méningite, etc.) et des articulations (arthrite du genou surtout),
- plus rarement des atteintes de la peau, du cœur (troubles du rythme) et/ou de l'œil.

Ces atteintes justifient une consultation spécialisée du service d'Infectiologie d'un hôpital pour confirmer le diagnostic de maladie de Lyme et prescrire un traitement antibiotique adapté.

Après plusieurs mois ou années

Toujours en l'absence de traitement, des atteintes chroniques du système nerveux, des articulations ou de la peau peuvent s'installer.



N'hésitez pas à vous connecter sur : <http://www.citique.fr>, <https://www.ausangene.fr/medecins-ars.sante.fr/>



Supports de communication téléchargeables sur le site de Santé publique France
<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/borreliose-de-lyme/outils>



Documents



AFFICHE

Les conseils de Prudence : La tactique anti-tiques

Affiche à destination des enfants sur la maladie de Lyme, infection due à une bactérie transmise par les piqûres de tiques, et non contagieuse : qu'est-ce qu'une tique ? Pourquoi...

enfants

[TÉLÉCHARGER ↓](#)

[VOIR LA FICHE](#)

[COMMANDER 🛒](#)



DEPLIANT/FLYER

Les conseils de Prudence : La tactique anti-tiques

Dépliant d'information à destination des enfants sur la maladie de Lyme, infection due à une bactérie transmise par les piqûres de tiques, et non contagieuse : qu'est-ce...

enfants

[TÉLÉCHARGER ↓](#)

[VOIR LA FICHE](#)



DEPLIANT/FLYER

Maladie de Lyme et prévention des piqûres de tiques

Dépliant d'information sur la maladie de Lyme, infection due à une bactérie transmise par les piqûres de tiques, et non contagieuse : reconnaître les symptômes,...

[TÉLÉCHARGER ↓](#)

[VOIR LA FICHE](#)

Un dossier de presse sonore "La Maladie de Lyme : le flash prévention"

Explorez plus de musique comme

Existe t'il un traitement ?

sur SoundCloud.

[Découvrez plus sur SoundCloud](#)

[Privacy policy](#)

Explorez plus de musique comme

Les signes de la maladie de Lyme

sur SoundCloud.

[Découvrez plus sur SoundCloud](#)

[Privacy policy](#)

Explorez plus de musique comme

Que faire en cas d'une piqûre de tique ?

sur SoundCloud.

[Découvrez plus sur SoundCloud](#)

[Privacy policy](#)

Explorez plus de musique comme

Les bonnes pratiques au retour d'une activité e...

sur SoundCloud.

[Découvrez plus sur SoundCloud](#)

[Privacy policy](#)

Supports de communication téléchargeables sur le site de l'ARS AuRA

<https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/tique-des-outils-de-sensibilisation-pour-les-communes>



Vous souhaitez participer à l'information et la sensibilisation ?

Des outils de communication sont à votre disposition :

↓ [Affiche - tiques \(format A3\)](#) (pdf, 217.56 Ko)

↓ [Flyer - tiques](#) (pdf, 239.99 Ko)

↓ [Kit réseaux sociaux - tiques](#) (zip, 744.13 Ko)

Vidéo [Conseils pour se protéger contre les morsures de tiques](#)

Exposition L'Info Tiques

L'exposition L'Info Tiques, créée par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, l'URCPIE et illustrée par Vincent Gonnin, vise à expliquer ce qu'est une tique et ses lieux de vie, et à informer sur les gestes préventifs.

Vous pouvez [télécharger cette exposition L'Info Tiques](#) sur le site de l'URCPIE.

Cette exposition est également disponible à l'emprunt auprès de [la délégation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes présente dans votre département](#).



COMMENT ÉVITER LES MORSURES DE TIQUE ?

Lors d'une activité en plein air

- Portez des vêtements et chaussures couvrants
- Mettez un chapeau ou une casquette
- Restez sur les sentiers et évitez les hautes herbes
- Ne vous asseyez pas à même le sol
- Examinez régulièrement vos vêtements et le corps
- Prenez un tire-tique et du désinfectant avec vous

Après l'activité

- Inspectez tout votre corps. Faites-vous aider ou utilisez un miroir
- Prenez une douche
- Lavez vos vêtements
- Vérifiez le pelage de vos animaux de compagnie

Quand la tique attaque...

Les tiques sont des parasites qui vivent dans les forêts, parcs, talus, mais aussi dans les prairies ou jardins.

Elles peuvent transmettre la **maladie de Lyme** ou l'**encéphalite à tique**.



COMMENT RETIRER LA TIQUE ?

Enlevez-la **rapidement** avec un **tire-tique** (disponible en pharmacie)


Ne pas écraser la tique tant qu'elle n'a pas été retirée. Cela risquerait de lui faire régurgiter des bactéries.

Consultez rapidement votre médecin en cas de :

• symptômes

plusieurs jours ou semaines après la morsure : fatigue, fièvre, douleurs articulaires, maux de tête

• **plaque rouge** centrée sur le point de morsure et qui s'étend en cercle



www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



❖ Les CRMVT

Les Centres de Référence sur les Maladies Vectorielles liées aux Tiques (CRMVT) sont des services de Maladies Infectieuses, spécialisés dans la prise en charge des maladies transmises par les tiques et notamment la maladie de Lyme. Leurs missions sont l'expertise et la prise en charge de recours, le partage d'informations et la communication, la recherche et l'enseignement, sur la thématique des maladies transmises par les tiques et la borréliose de Lyme.

Il en existe 5 en France (à Rennes, Paris, Nancy – Strasbourg, Clermont-Ferrand – Saint-Étienne, Marseille), secondés par plusieurs centres de compétences.

**SEMAINE DE SENSIBILISATION
AUX MALADIES VECTORIELLES LIÉES AUX TIQUES**

TIQUES & VOUS

**INFORMATION & PRÉVENTION
DU 26 AU 31 MAI 2026**

-  **COMMENT ÉVITER LES PIQÛRES ?**
-  **QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRES ?**
-  **CONNAÎTRE LA MALADIE DE LYME**
-  **QUI ET QUAND CONSULTER ?**

**RETROUVEZ
+ D'INFORMATIONS**



Conception & réalisation graphique : direction de la communication du CHRU de Nancy, 2026.
Illustrations : CHRU de Nancy, vectreasy.com.

CRMVT
Centres de Référence des Maladies
Vectorielles liées aux Tiques

CHU
de Strasbourg

CHU
de Nancy

Hôpitaux
universitaires
de Marseille
ap-hm

CHRU
de Nancy

Les Hôpitaux
universitaires
de Strasbourg


CHU
de Grenoble

HÔPITAL
DES CHIRURGIENS
de la région de la Haute-Savoie

ars

CHU
de Bordeaux

MÉMOTIQUE



2.

Le genre
IXODES

Taille

Jusqu'à 11mm
lorsque gorgée
de sang

Signe distinctif

Présence d'une
plaque dorsale
(*scutum*)



Il existe au moins **18 espèces**
de ce genre en France.

La plus connue
et fréquemment rencontrée
est *Ixodes ricinus*.



Présents sur la quasi totalité du territoire,
mais rarement en climat méditerranéen.
Elles **ont besoin d'une certaine humidité** pro-
curée par la végétation (forêts, haies, brous-
sailles) car elles résistent mal à la dessiccation.



Pics d'activité au printemps et à l'automne,
en climat tempéré océanique et continental.
Le reste du temps, les tiques se réfugient dans
la végétation.

Biologie


On trouve *Ixodes ricinus*
généralement
**dans les biotopes abrités où
la végétation est abondante.**

Elle se nourrit sur la plupart
des vertébrés terrestres
(mammifères, oiseaux,
reptiles) qu'elle rencontre.
**Elle peut piquer l'homme au
stade larvaire, nymphal ou
adulte.**

Durée moyenne du cycle

2 à 3 ans
(variable en fonction du
climat).

A chaque stade,
la tique doit
se gorger de sang
sur un hôte
(durée : 3 à 10 jours
selon le stade et l'hôte).



Importance médico-vétérinaire

CHEZ L'HOMME

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Borrelia</i>	Maladie de Lyme
	<i>Anaplasma</i>	Anaplasmose granulocytaire
	<i>Rickettsia</i>	Rickettsioses
Virus	<i>Flavivirus</i>	Encephalite à tiques
Protozoaires	<i>Babesia</i>	Babésioses

CHEZ L'ANIMAL

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Anaplasma</i>	Anaplasmose granulocytaire (chiens, rumi- nants, chevaux)
	<i>Flavivirus</i>	Louping ill (moutons)
Protozoaires	<i>Babesia</i>	Babésiose bovine




INRAE

MÉMOTIQUE

5.

Le genre HYALOMMA



Taille
longueur à jeun : 5 mm
femelles gorgées :
2 cm

Signe distinctif

Pattes annelées de blanc.
Tiques chasseuses
donc très véloces.



Répartition variable selon les espèces :

- France Métropolitaine : *Hyalomma marginatum* récemment détectée dans l'Hérault, le Gard, et les Bouches-du-Rhône.
- Corse : *Hyalomma marginatum* abondante et *Hyalomma scoupsense* détectée récemment.



Stades adultes actifs au printemps et en été ;
larves et nymphes en début d'été ; dormance hivernale.

Il existe **3 espèces en Europe** :

Hyalomma marginatum
Hyalomma lusitanicum
Hyalomma scoupsense

Leur distinction nécessite un examen sous loupe binoculaire.



Grande variété d'hôtes vertébrés domestiques ou sauvages

Grands mammifères (dont
l'homme très occasionnellement),
oiseaux, lagomorphes, rongeurs,
et hérissons.

Biologie **Durée moyenne du cycle** : 6 mois à 1 an

Habitats préférentiels : forêts arbustives
sèches telles que maquis ou garrigues



Importance médico-vétérinaire

CHEZ L'HOMME

transmission de	genre	responsable de
Virus	/	Fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Bactéries	<i>Rickettsia aeschlimannii</i> <i>Anaplasma phagocytophilum</i>	Syndromes grippaux et éruptions cutanées




CHEZ L'ANIMAL

transmission de	genre	responsable de
Protozoaires	<i>Babesia</i> / <i>Theileria</i>	Piroplasmoses équine et bovine

MÉMOTIQUE

1.

Le genre DERMACENTOR



Taille
3 - 6,5 mm

Signe distinctif

pigmentation
blanchâtre
(émaillé) sur la face-
dorsale



Présent dans toute la France,
dans les forêts, prairies, landes, broussailles...



Les adultes sont observés plus tôt que les autres espèces de tiques, **notamment en février-mars** mais leur présence s'étale sur l'automne et le printemps.


Il existe 2 espèces de ce genre en Europe
Dermacentor marginatus
& *D. reticulatus*.

La distinction entre les 2 espèces nécessite un examen sous loupe binoculaire.

Biologie

La **durée moyenne du cycle est d'environ 1 à 2 ans**. Elle varie en fonction des espèces et des conditions environnementales.

Tiques dont les stades immatures (**larves et nymphes**) se gorgent préférentiellement sur les petits mammifères, dans leurs terriers.



Les **adultes** s'attaquent aux mammifères de taille moyenne à grande (sangliers, cerfs, chevreuils, vaches, moutons, chèvres, chevaux, chiens...) et **occasionnellement à l'homme** (notamment au niveau de la tête et du cou).



Importance médico-vétérinaire

CHEZ L'HOMME

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Rickettsia</i>	Syndrome TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy)



CHEZ L'ANIMAL

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Anaplasma</i>	Anaplasmose (petits-ruminants)
Protozoaires	<i>Babesia</i> / <i>Theileria</i>	Piroplasmoses (chiens, chevaux)



FREDON
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

MERCI

Hélène Leclerc
Conseillère environnement

helene.leclerc@fredon-aura.fr

07 68 91 53 68